

100 オビヌツズマブ単独

申請日 令和2年7月15日
委員会承認日 令和2年8月19日

病名: 悪性リンパ腫

1コース: 3週間隔 (8サイクル) ★1サイクル目は、day1、day8、day15に投与。2回目以降はday1のみ投与。

			投与スケジュール																				
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢ライン																							
①	生理食塩液	100mL	↓																				
②	生理食塩液	210mL	↓																				
	オビヌツズマブ	1000mg/40mL	↓																				
	注)1 所要時間																						
③ 内服	オロパタジン 5mg	1錠	↓																				
	アセトアミノフェン 200mg	5錠	↓																				
	オビヌツズマブ点滴1時間前																						

- ・注)1 25mL/hで開始。点滴開始後問題なければ30分ごと25mL/hずつ増量。最大100mL/h。
- ・オビヌツズマブ 点滴フィルター使用。
- ・オビヌツズマブはinfusion reaction のリスクが高いと判断される場合には、ステロイド投与を検討。PSL100mg、またはDEX20mg
またはメチルプレドニゾン80mg。ヒドロコルチゾン効果ないため使用しない。(適正使用ガイド)