病名:悪性リンパ腫

1コース:3週間隔 ★リツキシマブは2日目投与

	投与スケジュール															_											
	投与方法•投与量		1	2	3			6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				_
末梢ライン ①	生理食塩液	100mL	1	Ţ																							_
2	生理食塩液 パロ/セトロン静注 プレドニン20mg	50mL 0.75mg/5mL 100mg 15分	↓ ↓ ↓																								<u>-</u>
3	生理食塩液 シクロホスファミド	250mL 【750mg/m <sup>2</sup> 】 1時間	1																								<u>-</u>
4 管注	生理食塩液 ビンクリスチン	20mL 【1.4mg/m <sup>2</sup> 】 5分	<u> </u>																								
5	生理食塩液 リツキシマブ	500mL 【375mg/m <sup>2</sup> 】 注)1 所要時間		↓ ↓																							<u> </u>
⑥内服	プレドニン 5mg CVP療法実施した翌日か アセトアミノフェン 200mg	20錠 1日2回朝昼食後 ら4日間 2錠		↓ ↓	<b>↓</b>	1	1																				<u>-</u>
	オロパタジン 5mg リツキシマブ投与前	1錠		Ì																							 

- ・リツキシマブは、1mg/1mLに調製する。生食で10倍希釈なるように調整する。
- ・リツキシマブは、infusion reactionのための前投与薬(内服)あり。
- ・注)1 初回50mL/hで開始。副作用を確認しながら30分毎に注入速度を50mL/hずつあげる(最大400mL/h)
- ・ 速度変更時は、バイタル確認。2回目以降は初回副作用が軽微だった場合100mL/hまで上げて開始(無理はしない。) 問題なければ30分毎に100mL/hずつあげる。患者の状態を確認しながら適宜減速してください。