

102

R-CVP療法

1日ver

申請日 令和2年7月15日
委員会承認日 令和2年8月19日

病名: 悪性リンパ腫

1コース: 3週間隔

★R-CVP2コース目以降、外来1日レジメン

			投与スケジュール																											
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
末梢ライン																														
①	生理食塩液	100mL	↓																											
②	生理食塩液	500mL	↓																											
	リツキシマブ	【375mg/m ² 】	↓																											
	注)1 所要時間																													
③	生理食塩液	50mL	↓																											
	ハロ/セトン静注	0.75mg/5mL	↓																											
	プレドニン20mg	100mg	↓																											
	15分																													
④	生理食塩液	250mL	↓																											
	シクロホスファミド	【750mg/m ² 】	↓																											
	1時間																													
⑤ 管注	生理食塩液	20mL	↓																											
	ビンクリスチン	【1.4mg/m ² 】	↓																											
	5分																													
⑥内服	プレドニン 5mg	20錠	↓	↓	↓	↓																								
	1日2回朝食後																													
	CVP療法実施した翌日から4日間																													
	アセトアミノフェン 200mg	2錠	↓																											
	オロパタジン 5mg	1錠	↓																											
	リツキシマブ投与前																													

・リツキシマブは、1mg/1mLに調製する。生食で10倍希釈するように調整する。

・リツキシマブは、infusion reactionのための前投与薬(内服)あり。

・注)1 初回50mL/hで開始。副作用を確認しながら30分毎に注入速度を50mL/hずつあげる(最大400mL/h)

・速度変更時は、バイタル確認。2回目以降は初回副作用が軽微だった場合100mL/hまで上げて開始(無理はしない。)問題なければ30分毎に100mL/hずつあげる。患者の状態を確認しながら適宜減速してください。