

127 CapeOX+Trastuzumab療法

■適応:HER2陽性胃がん 1次治療

投与量

トラスツズマブ (初回) 8mg/kg day1

トラスツズマブ (2回目以降) 6mg/kg day1

オキサリプラチン 130mg day1 2hr div

カペシタビン(経口薬) day1タ～day15朝、分2

3週毎を1コースとして繰り返す。

薬品名	投与時間	day1	day8	day15	...	day22
①生理食塩液 100mL (ルートキープ)	5分	↓				↓
②生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1A+デキサート1.65mg3A	30分	↓				↓
③オキサリプラチン130mg/m ² +5%ブドウ糖液250mL	30分	↓				↓
④トラスツズマブ8mg/kg(2回目以降6mg/kg)+生理食塩液250mL(注射用水適)	90分	↓				↓
⑤生理食塩液50mL	5分	↓				↓
カペシタビンは下記用量を分2で内服(day1夕～day15朝)	1日2回朝夕	●	●	●	●	●

体表面積	Cape用量
$< 1.36\text{m}^2$	2400mg/day
$1.36\text{m}^2 \sim 1.66\text{m}^2$	3000mg/day
$1.66\text{m}^2 \sim 1.96\text{m}^2$	3600mg/day
$1.96\text{m}^2 \leq$	4200mg/day

主な副作用: 骨髄抑制、消化器症状、末梢神経障害、下痢、脱毛、倦怠感、手足症候群、過敏反応、infusion reaction、心不全など