

## 130 パージェタ・トラスツズマブ・ドセタキセル併用

■適応: HER2陽性の乳がん

### 投与量

パージェタ 420mg(初回840mg) day1  
 トラスツズマブ 6mg/kg(初回8mg/kg) day1  
 ドセタキセル 75mg/m<sup>2</sup> day1

3週毎を1コースとして繰り返す。

| 薬品名   | 投与時間 | day1 | ... | day22 |
|---|------|------|-----|-------|
| ①生理食塩液 100mL(ルートキープ)                                | 5分   | ↓    |     | ↓     |
| ②パージェタ420mg(初回840mg) + 生理食塩液250mL                   | 60分  | ↓    |     | ↓     |
| ③トラスツズマブ6mg/kg(初回8mg/kg) + 生理食塩液250mL + 注射用水適量      | 90分  | ↓    |     | ↓     |
| ④生理食塩液100mL(初回のみ60分経過観察)                            | 60分  | ↓    |     | ↓     |
| ⑤生理食塩液100mL + ファモチジン20mg1A + ポララミン1A + デキサート3.3mg2A | 10分  | ↓    |     | ↓     |
| ⑥ドセタキセル75mg/m <sup>2</sup> + 5%ブドウ糖250mL            | 60分  | ↓    |     | ↓     |

パージェタ、トラスツズマブは初回何ともなければ30分まで短縮可

主な副作用: infusion reaction、心不全、間質性肺炎、骨髄抑制、浮腫、倦怠感、消火器症状、末梢神経障害、関節痛・筋肉痛など