

039 CAPOX/SOX+Bmab 療法

申請日 平成28年2月25日
委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん

1コース:3週間ごと

投与方法・投与量			投与スケジュール																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢メイン																							
①	生理食塩液	100mL	↓																				
②	生理食塩液	100mL	↓																				
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	↓																				
③	生理食塩液	100mL	↓																				
	ホスネツピタント 235mg 1v		↓																				
	パロノセトロン 0.75mg 1v		↓																				
	デキサート 3.3mg【4mg】3A		↓																				
	投与時間:30分																						
④	5%ブドウ糖	250mL	↓																				
	オキサリプラチン 【130mg/m ² 】		↓																				
	投与時間:2時間																						
④	生理食塩液	50mL	↓																				

・ペバシズマブは、初回投与90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

・CAPOXの場合、カペシタビン併用	1.31m ² 未満	1800mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.31m ² 未満1.64m ² 未満	2400mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.64m ² 未満	3000mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用

・SOXの場合、TS-1併用	1.25m ² 未満	80mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.25m ² 未満1.5m ² 未満	100mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.5m ² 未満	120mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用