

008

ビダーザ[®]点滴療法

病名: 骨髄異形成症候群

1コース: 4週間隔

申請医師: 川上

委員会承認日 平成28年4月15日

投与スケジュール

| 投与方法・投与量 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|-----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 末梢ライン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | 生理食塩液 | 50mL | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 管注 | ラモセトロン0.3mg 1A | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 40mL | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射用水 | 10mL | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ビダーザ | 【75mg/m ² 】 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所要時間: 10分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注意事項

・ビダーザ1瓶(100mg)に対して、注射用水10mLで溶解、必要量を生理食塩液に混注する。