

094 R-CHOP療法 1日ver

申請日 令和2年6月3日  
委員会承認日 令和2年7月15日

病名:悪性リンパ腫

1コース:3週間隔

			投与スケジュール																				
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢ライン																							
①	生理食塩液	100mL	↓																				
②	生理食塩液	50mL	↓																				
	ハロ/セト静注0.75mg	5mL	↓																				
	プレドニン20mg	100mg	↓																				
	所要時間:15分																						
③	生理食塩液	50mL	↓																				
	ドキシソルビシン	【50mg/m <sup>2</sup> 】	↓																				
	所要時間:15分																						
④	生理食塩液	50mL	↓																				
⑤	生理食塩液	250mL	↓																				
	シクロホスファミド	【750mg/m <sup>2</sup> 】	↓																				
	所要時間:1時間																						
⑥ 管注	生理食塩液	20mL	↓																				
	ビンクリスチン	【1.4mg/m <sup>2</sup> 】	↓																				
	所要時間:5分かけて																						
⑦	生理食塩液	375mL	↓																				
	リツキシマブ	【375mg/m <sup>2</sup> 】	↓																				
	所要時間:注1)																						
⑧内服	プレドニン(5)	20錠		↓	↓	↓	↓																
	オロパタジン(5)	1錠		↓																			
	カロナール(200)	2錠		↓																			
	アプレピタント	125mg		↓																			
		80mg			↓	↓																	

注意事項

- ・リツキシマブは、infusion reactionのための前投与薬(内服)あり。
- ・リツキシマブは、1mg/1mLに調製する。(リツキサンは生食で10倍に希釈。)
- ・リツキシマブは、初回50mL/hで開始。副作用を観察しながら、30分毎に注入速度50mL/hずつあげる。(最大400mL/hまで)
- ・2回目以降は初回副作用が軽微だった場合100mL/hまで上げて開始。(無理はしない。)問題なければ30分毎に100mL/hずつあげる。患者の状態を確認して適宜減速してください。
- ・プレドニン 100mg/body 5日間 初日点滴、2日目から内服