

095 R-THP-COP (2日ver)

申請日 令和2年6月8日
委員会承認日 令和2年7月15日

病名:悪性リンパ腫

1コース:3週間隔

投与方法・投与量			投与スケジュール																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
末梢ライン																													
①	生理食塩液	100mL	↓	↓																									
②	生理食塩液	50mL	↓																										
	ハロノセトン静注0.75mg	1v	↓																										
	プレドニン20mg	100mg	↓																										
	所要時間:15分																												
③	生理食塩液	50mL	↓																										
	ピラルビシン 注1)	【50mg/m ² 】	↓																										
	所要時間:30分																												
④	生理食塩液	50mL	↓																										
⑤	生理食塩液	250mL	↓																										
	シクロホスファミド	【750mg/m ² 】	↓																										
	所要時間:1時間																												
⑥ 管注	生理食塩液	20mL	↓																										
	ピンクリスチン	【1.4mg/m ² 】	↓																										
	所要所間:5分かけて																												
⑦	生理食塩液	375mL		↓																									
	リツキシマン	【375mg/m ² 】		↓																									
	所要時間:注2)																												
⑧内服	プレドニン錠5mg	100mg		↓	↓	↓	↓																						
	1日2回朝食食後 4日分																												
	(THP-COP施行後翌日から4日間)																												
⑨内服	アブレピタント	125mg	↓																										
		80mg		↓	↓																								
⑩内服	オロパタジン(5)	1錠		↓																									
	アセトアミノフェン(200)	2錠		↓																									
	リツキシマブ投与30分前																												

注意事項

- ・ピラルビシンは要フィルター
- ・リツキシマブは、infusion reactionのための前投与薬(内服)あり。
- ・リツキシマブは、1mg/1mLに調製する。(10倍希釈9
- ・リツキシマブは、50mL/hで開始。その後30分毎に50mL/hずつ増量。2回目以降100mL/hで開始、問題なければ以後、30分毎に100mL/hずつ速度を上げる。最大投与速度は400mL/h
- ・プレドニン 100mg/body 5日間 初日点滴、2日目から内服