

004 R-CHOP療法（RIT2日目投与）

■適応：CD20陽性の非ホジキンリンパ腫

投与量			3週毎
リツキシマブ	375mg/m ²	day2	
ドキシソルビン	50mg/m ²	day1	
シクロフォスファミド	750mg/m ²	day1	
ビンクリスチン	1.4mg/m ² (最大2mg)	day 1	
プレドニゾロン	100mg/Body	day 1 ~5	

薬品名	投与時間	day1	day2	...	day21
①生理食塩液 100mL (ルートキープ)	5分	↓	↓		
②パロノセトロン1V+プレドニン注100mg+生理食塩液50mL	15分	↓			
③ドキシソルビン50mg/m ² +生理食塩液50mL	15分	↓			
④生理食塩液50mL(ドキシソルビン投与後ルート確認)	15分	↓			
⑤エンドキサン750mg/m ² +生理食塩液250mL	60分	↓			
⑥オンコビン注1.4mg/m ² (Max2mg)+生理食塩液20mL	5分	↓			
⑦リツキシマブBS375mg/m ² +生理食塩液 必要量(リツキシマブ10倍希釈)	規定速度		↓		
day2~5のプレドニゾロンは通常経口で。(プレドニン錠5mg20錠1日2回朝昼食後)					
投与時の注意					
高度催吐リスクレジメンであり、基本的には制吐薬適正使用ガイドラインに準じた対応を行う。(NK1受容体拮抗薬、デキサメタゾンなど)					
主な副作用：骨髄抑制、消化器症状、末梢神経障害、間質性肺炎、心毒性、便秘、脱毛など					