

104 ガザイバ+ベンダムスチン療法

■適応：CD20陽性の濾胞性リンパ腫

投与量

ガザイバ(オビヌツズマブ 1000mg/Body day1,(8),(15) 28日サイクル、6コース点滴施行する

(オビヌツズマブは1コース目のみday1,8,15に投与、2コース目以降はday1のみに投与)

ベンダムスチン 90mg/m² day1,2

薬品名	1コース目	投与時間	day1	day2	・・・	day8	・・・	day15	・・・	day28
①生理食塩液 100mL		ルートキープ	↓	↓		↓		↓		
②生理食塩液 50mL+デキサート(4mg)3A+グラニセトロン1A		15分	↓							
②生理食塩液 50mL+グラニセトロン1A		15分		↓						
③ベンダムスチン90mg/m ² +生理食塩液250mL		10分	↓	↓						
④ガザイバ1000mg+生理食塩液210mL		規定速度で	↓			↓		↓		
薬品名	2～6コース	投与時間	day1	day2	・・・					day28
①生理食塩液 100mL		ルートキープ	↓	↓						
②生理食塩液 50mL+デキサート(4mg)3A+グラニセトロン1A		15分	↓							
②生理食塩液 50mL+グラニセトロン1A		15分		↓						
③ベンダムスチン90mg/m ² +生理食塩液250mL		10分	↓	↓						
④ガザイバ1000mg+生理食塩液210mL		規定速度で	↓							
コメント ガザイバ投与速度はガザイバ適正使用ガイドに従う。 ガザイバのinfusion reactionを軽減させるため、投与1時間前に抗ヒスタミン剤、アセトアミノフェンを服用する。 ガザイバ投与時はフィルターを使用する 主な副作用：infusion reaction,注射部位反応、血管痛、骨髄抑制、感染症、消化器症状、皮膚症状、腫瘍崩壊症候群など										

参考文献

①中外製薬 ガザイバ適性使用ガイド

②トレアキシン適性使用ガイド