

107 R-GDC療法 外来Day1,8Ver (リツキシマブ+ゲムシタビン+カルボプラチン+デキサメタゾン)

■適応: Diffuse Large B-Cell Lymphoma (救援療法)

投与量

リツキシマブ 375mg/m² day1
 ゲムシタビン 1000mg/m² day1,8
 カルボプラチン 目標AUC 5 day1
 デキサメタゾン 40mg/body day1~4

21日毎を1コースとして繰り返す。

薬品名	投与時間	day1	day2	...	day8	...	day21
・生理食塩液 50mL	ルートキープ	↓			↓		
・生理食塩液 50mL+デキサート(4mg)10A+グラニセトロン1A	15分	↓					
・生理食塩液 50mL+デキサート(4mg)2A+グラニセトロン1A	15分				↓		
・ゲムシタビン1000mg/m ² +5%ブドウ糖液100mL	30分	↓			↓		
・カルボプラチン(目標AUC5)+生理食塩液250mL	60分	↓					
・リツキシマブ375mg/m ² +生理食塩液(10倍で希釈)	規定速度で	↓					

コメント
 day8の好中球数が500/ μ L未満、あるいは血小板数が5万/ μ L未満の場合はday8のGEMは中止。
 同日の好中球数が500~1000/ μ L、あるいは血小板数が5~10万/ μ Lの場合はday8のGEMを75%量に減量する。
 腎障害の場合を想定しGDP療法のCCDPをCBDCA(AUC5)に置換したGDC療法での申請。
 Day2~4のデキサメタゾンは経口で

主な副作用: infusion reaction, 骨髄抑制、消化器症状、倦怠感、肝障害、血管痛、脱毛など

参考文献

- ①血液病レジデントマニュアル P267-268
- ②NCCN ガイドライン Version 1.2021, Diffuse Large B-Cell Lymphoma
- ③Cancer2004;101:1835-1842
- ④Leuk Lymphoma.2010 August;51(8):1523-1529