

140 フェスゴ配合皮下注+ドセタキセル療法

■適応: HER2陽性乳癌

投与量

フェスゴ配合皮下注 day 初回用量 IN(PER1200mg+HER600mg) 3週毎を1コースとして繰り返す。
維持用量 MA(PER1200mg+HER600mg)

ドセタキセル 75mg/m² day1

投与日	薬品名	投与時間	day1	day21
1コース目	①生理食塩液 100mL ルート確保 ②フェスゴ配合皮下注 IN 8分以上かけて大腿部へ皮下注射 ③生理食塩液100mL+デキサート6.6mg+ポララミン1A ④ドセタキセル75mg/m ² +5%ブドウ糖250mL	8分 15分 60分	↓ ↓ ↓ ↓		
2コース目以降	①生理食塩液 100mL ルート確保 ②フェスゴ配合皮下注 MA 5分以上かけて大腿部へ皮下注射 ③生理食塩液100mL+デキサート6.6mg+ポララミン1A ④ドセタキセル75mg/m ² +5%ブドウ糖250mL	5分 15分 60分	↓ ↓ ↓ ↓		
投与時の注意 フェスゴ配合皮下注はIN(初回用量)、MA(維持用量)の2規格あるので取り違えに注意。 infusion reaction発現の可能性あるため、フェスゴ注射後経過観察の時間を持ちinfusion reactionの症状が現れていない事を確認して次の薬剤へ。 注射部位反応の報告があるため、同一箇所への繰り返しの注射はさけ、新たな注射部位は前回の注射部位から少なくとも2.5cm以上は離す。					
主な副作用: infusion reaction,注射部位反応、心不全、骨髄抑制、関節痛・筋肉痛、消化器症状、便秘、倦怠感、肝障害、浮腫など					

参考文献

- ①フェスゴ配合皮下注 適正使用ガイド
- ②フェスゴ配合皮下注 添付文書
- ③FeDeriCa試験: Lancet Oncol.2021;22(1):85-97