

033 FOLFOX+Bmab 療法

申請日 平成28年2月23日  
 委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん

1コース:2週間ごと

投与スケジュール

| 投与方法・投与量 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 末梢メイン    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ①        | 生理食塩液 100mL                                 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ②        | 生理食塩液 100mL                                 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | ベバシズマブ 5mg/kg                               | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ③        | 生理食塩液 100mL                                 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | ホスネツピタント 235mg 1v                           | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | パロノセトロン 0.75mg 1v                           | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | デキサート 3.3mg【4mg】3A<br>投与時間:30分              | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ④        | 5%ブドウ糖 250mL                                | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | レボホリナート 【200mg/m <sup>2</sup> 】<br>投与時間:2時間 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ④        | 5%ブドウ糖 250mL                                | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | オキサリプラチン 【85mg/m <sup>2</sup> 】<br>投与時間:2時間 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | *レボホリナートと並行して投与                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ④        | 生理食塩液 50mL                                  | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | 5-FU 【400mg/m <sup>2</sup> 】<br>投与時間:15分    | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| ⑤        | 生理食塩液 100mL                                 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|          | 5-FU 【2400mg/m <sup>2</sup> 】<br>投与時間:2mL/h | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

・ベバシズマブは、初回投与90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与  
 ・⑤は連続46時間投与