

037 CAPIRI/IRIS 療法

申請日 平成28年2月23日  
 委員会承認日 平成28年4月15日

病名:大腸がん  
 1コース:3週間ごと

投与スケジュール

投与方法・投与量		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
末梢メイン																						
①	生理食塩液 100mL	↓																				
②	生理食塩液 100mL	↓																				
	ホスネツピタント 235mg 1v	↓																				
	パロノセトロン 0.75mg 1v	↓																				
	デキサート 3.3mg【4mg】3A	↓																				
	投与時間:30分																					
③	5%ブドウ糖 250mL	↓																				
	イリノテカン 【120mg/m <sup>2</sup> 】	↓																				
	投与時間:2時間																					
	*レボホリナートと並行して投与																					
④	生理食塩液 50mL	↓																				

・CAPIRIの場合、カペシタビン併用	1.31m <sup>2</sup> 未満	1800mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.31m <sup>2</sup> 未満1.64m <sup>2</sup> 未満	2400mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.64m <sup>2</sup> 未満	3000mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
・IRISの場合、TS-1併用	1.25m <sup>2</sup> 未満	80mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.25m <sup>2</sup> 未満1.5m <sup>2</sup> 未満	100mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用
	1.5m <sup>2</sup> 未満	120mg	1日2回(day1夕～開始 day15朝まで)2投1休で併用