

038 CAPOX/SOX 療法

申請日 平成28年2月23日
 委員会承認日 平成28年4月15日

病名: 胃がん

1コース: 3週間ごと

| | | | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与方法・投与量 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 末梢メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① | 生理食塩液 | 100mL | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 生理食塩液 | 100mL | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ホスネツピタント 235mg | 1v | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パロノセトロン 0.75mg | 1v | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサート 3.3mg【4mg】 | 3A | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与時間: 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 5%ブドウ糖 | 250mL | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキサリプラチン | 【130mg/m ² 】 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与時間: 2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 生理食塩液 | 50mL | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--------|----------------------------------|
| ・CAPOXの場合、カペシタビン併用 | 1.31m ² 未満 | 1800mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |
| | 1.31m ² 未満1.64m ² 未満 | 2400mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |
| | 1.64m ² 未満 | 3000mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |
| ・SOXの場合、TS-1併用 | 1.25m ² 未満 | 80mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |
| | 1.25m ² 未満1.5m ² 未満 | 100mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |
| | 1.5m ² 未満 | 120mg | 1日2回 (day1夕～開始 day15朝まで) 2投1休で併用 |