

040 GEM+nab-PTX 療法

申請日 平成28年2月25日  
 委員会承認日 平成28年4月15日

病名: 膵臓がん

1コース: 3週間投与 1週休薬

			投与スケジュール																											
投与方法・投与量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
末梢メイン																														
①	生理食塩液	100mL	↓																											
②	生理食塩液	100mL	↓																											
	グラニセトロン 3mg	1A	↓																											
	デキサート 3.3mg【4mg】	2A	↓																											
	投与時間: 30分																													
③	生理食塩液	50mL	↓																											
④	生理食塩液	100mL	↓																											
	nab-PTX	【125mg/m <sup>2</sup> 】	↓																											
	投与時間: 30分																													
⑤	生理食塩液	50mL	↓																											
⑥	生理食塩液	100mL	↓																											
	ゲムシタピン	【1000mg/m <sup>2</sup> 】																												
	点滴速度: 200mL/h																													
④	生理食塩液	50mL	↓																											

・nab-PTX 投与時フィルター禁。アブラキサンは特定生物由来製剤のため、血液製剤使用票に記入。  
 ・nab-PTX100mg1バイアルにつき、生食20mLで溶解する。必要量を空のバックに注入する。懸濁液を生食に希釈しないこと。  
 ・nab-PTX全量50mL以下の場合は、シリンジに計り取る。